

Alirokumab

Endret 5/17, 7/18

Preparatnavn: Praluent inj.

ATC-kode: C10AX14

Indikasjon:	Familiær heterozygot hyperkolesterolemi
Diagnosekode:	ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93
Hjemmel:	§ 3 ICD-10: E78.0
Vilkår:	<ul style="list-style-type: none">- Gentest skal være utført- LDL-kolesterol \geq 5 mmol/L under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib
Krav til tidligere behandling:	<ul style="list-style-type: none">- For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-gruppe C10AA) og ezetimib (ATC-kode C10AX09) Laveste dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) skal være forsøkt.- For brukere som tåler statiner: Høyeste tolererbare dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09)- Ved kontraindikasjoner mot statiner, jf. punkt 4.3 i SPC: ezetimib (ATC-kode C10AX09)
Spesialistkrav:	Søknad fra spesialist i indremedisin, <i>spesialist i nevrologi*</i> , spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling. <i>* Gyldig fra 1. mai 2018</i>

Indikasjon:	Hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom ** (sekundærprevensjon)
Hjemmel:	§ 3 ICD-10: - 26
Vilkår:	LDL-kolesterol \geq 4 mmol/L under pågående behandling med maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib
Krav til tidligere behandling:	<ul style="list-style-type: none"> - For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-gruppe C10AA) og ezetimib (ATC-kode C10AX09) Laveste dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) skal være forsøkt. - For brukere som tåler statiner: Høyeste tolererbare dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09) - Ved kontraindikasjoner mot statiner, jf. punkt 4.3 i SPC: ezetimib (ATC-kode C10AX09)
Spesialistkrav:	<p>Søknad fra spesialist i indremedisin, <i>spesialist i nevrologi*</i>, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.</p> <p><i>* Gyldig fra 1. mai 2018</i></p> <p>** Sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom</p>

Indikasjon:	Hyperkolesterolemi hos pasienter som får eller er aktuelle for LDL-aferebehandling
Diagnosekode:	ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93
Hjemmel:	§ 3 ICD-10: E78.0
Krav til tidligere behandling:	<ul style="list-style-type: none"> - For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-gruppe C10AA) og ezetimib (ATC-kode C10AX09) Laveste dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) skal være forsøkt. - For brukere som tåler statiner: Høyeste tolererbare dose rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09) - Ved kontraindikasjoner mot statiner, jf. punkt 4.3 i SPC: ezetimib (ATC-kode C10AX09)
Spesialistkrav:	<p>Søknad fra spesialist i indremedisin, <i>spesialist i nevrologi*</i>, spesialist i barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.</p> <p><i>* Gyldig fra 1. mai 2018</i></p>

Retningslinjene er bestemt av Helsedirektoratet, basert på en refusjonskontrakt mellom det offentlige og legemiddelfirmaet, jf. legemiddeloven § 6.

Vilkårene er uttømmende for disse indikasjonene. Det ytes kun individuell stønad til de indikasjonene som omfattes av disse retningslinjene.
Dokumentet oppdateres ved behov, og er kun gyldig per dags dato.